


放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

我们为您提供这些信息以便支持您并使您的治疗尽可能舒适和成功。如果您有任何疑问，请咨询 BC 省癌症中心（BC Cancer）为您提供服务的医护团队。



本文适用于**骨盆区域**接受放射治疗的患者，无论您患的是哪种癌症。

骨盆区域的一些器官包括：

- 肛门
- 膀胱
- 宫颈
- 子宫内膜
- 卵巢
- 阴茎
- 前列腺
- 直肠
- 睾丸
- 子宫
- 阴道
- 外阴

预约和时间安排

Appointments and Scheduling

- **患者身份核对政策：**为了您的安全，我们会在每次检测、医疗程序或治疗（包括放射治疗）之前核对您的身份信息。在每次治疗之前，我们会询问您的姓名和出生日期，或查看您带有照片的身份证件。
- 周末或法定假日不安排预约。
- 预约时间可能临时改变。如果您是外地患者，请在行程安排和住宿方面留出一定的灵活性。

放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

膀胱充盈和排空说明

Bladder Instructions

膀胱充盈（如适用，请打 ✓）

在治疗过程中，充盈的膀胱会将部分小肠和膀胱推移出治疗区域。这可帮助减少某些副作用，例如腹泻和膀胱不适。

放射治疗团队的医生会教您如何使膀胱充盈以进行治疗。他们会告诉您喝多少水以及何时喝。

您会感到想要排尿，但没有到极度不适的程度。每个人所需的饮水量和时间会有所不同。治疗一结束，您就可以排尿了。

或

膀胱排空（如适用，请打 ✓）

排空的膀胱会有助于减轻您可能会有的一些副作用。在治疗期间您的膀胱必须是排空的，这一点很重要。

请在治疗前约 5 分钟排空膀胱（排尿）。这将确保您的膀胱每天都处于相同的位置，而且与计划治疗时的位置一致。

副作用

Side Effects

放射治疗会损害癌细胞，但也会影响治疗区域的正常组织。对正常组织的损害可能会引起副作用。这些副作用各有不同，具体取决于：

- 处方开具的辐射量。
- 正在接受治疗的部位。
- 治疗区域的大小。
- 是否正在接受化疗。

放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

放射肿瘤科团队的医生将向您说明在治疗期间您可能会有哪些副作用。在治疗期间，您会定期去见护士或医生。你们会谈谈到辐射副作用的问题。您见的医生可能不是您的放射肿瘤科的医生。

如果您在见护士或医生期间有任何问题或疑虑，请向您的放射治疗师咨询，以便我们可以马上为您提供帮助。

疲倦 Fatigue

疲倦是一种极度乏力的感觉。如果您感到疲倦，则可能需要多休息、多睡觉。疲倦有很多致因：

- 放射治疗
- 以前的治疗
- 情绪压力
- 生活习惯的改变。

您也许可以继续正常的生活习惯，或者您可能需要根据您的精力来调整日常习惯。您也可以登录 BC 省癌症中心网站，浏览 [Managing Fatigue](#)（应对疲倦）页面。

肠道和直肠反应 Bowel and Rectal Reaction

如果您的治疗区域包括肠道，您可能会经历：

- 腹痛
- 腹胀
- 频繁排便、稀便或腹泻
- 排泄水样粘液甚至大便带血

您可以采取以下措施来帮助改善肠道反应：

- 每天尝试至少喝 8-10 杯（2-2.5 升）液体（除非您的饮食限制液体摄入）
- 不要服用泻药（有助于排便的药物），除非 BC 省癌症中心的医护团队告诉您要服用。
- 尝试保持健康饮食

- 尽量不要进食会刺激肠胃的食物和饮料，例如：
 - 富含纤维的水果和蔬菜
 - 油炸食品
 - 香料和胡椒
 - 咖啡和茶
 - 可可粉
 - 酒精

如果您不确定该吃什么，或者您有肠道方面的问题，请要求向 BC 省癌症中心的营养师咨询。您也可以访问 BC 省癌症中心网站，浏览 [Nutrition Information](#)（营养信息）页面或 [How to Treat Diarrhea caused by your Treatments and Medications](#)（如何应对由治疗和药物引起的腹泻）。

您可能会觉得坐浴有舒缓的作用。坐浴可以清洁和舒缓发炎的酸痛皮肤。请参阅资料单张 [Sitz Baths](#)（坐浴）或向 BC 省癌症中心的医护团队索取副本。

膀胱反应

Bladder Reaction

您可能会有部分或所有下面这些泌尿系统症状：

- 尿频（排尿更频繁）。
- 尿急（您突然想要排尿）
- 排尿时有灼热感
- 滴尿

尿液中还可能有血。尝试每天至少喝 8 到 10 杯（2 升）液体。液体可以是水、果汁、清汤、运动饮料和草本茶。

医生可能会让您收集尿液样本以检测是否有感染。如果需要，他们可能会开药。

子宫内膜、子宫颈、子宫或阴道反应

Endometrium, Cervix, Uterus or Vaginal Reaction

如果治疗区域包括子宫内膜、子宫颈、子宫或阴道，则可能会出现腹痛或腹胀。也可能出血，或白带增多或有异味（发臭）。

放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

如果出血量特别大，即使是在月经期，也请告知 BC 省癌症中心为您提供服务的医护团队。医生可能会让您验血以检查血细胞计数。

如果需要，可以使用卫生巾或卫生纸。您可能不能使用卫生棉条。如果您想使用卫生棉条，请与为您提供服务的放射治疗团队联系。

请不要做阴道灌洗，除非您的肿瘤科医生告诉您可以这样做。

只要您没有感到不适、疼痛或流血过多，就可以有性生活。如果您不确定，请咨询 BC 省癌症中心为您提供服务的医护团队。

痔疮

Hemorrhoids

放射治疗可能会导致痔疮发作。您可能会觉得坐浴有舒缓的作用。请向 BC 省癌症中心的医护团队咨询哪种痔疮膏适合您。

疼痛

Pain

如果您因癌症或相关治疗而感到疼痛，请告知 BC 省癌症中心为您提供服务的医护团队。您也可以登录 BC 省癌症中心网站，浏览 [Pain from Cancer](#)（癌痛）页面。

皮肤护理

Skin Care

如果您正在接受外部放射治疗，则治疗区域可能会出现皮肤反应。请与 BC 省癌症中心的医护团队联系，了解这个问题是否可能会发生在您身上。

接受治疗部位的皮肤可能会发热、发干或发痒。皮肤可能会改变颜色（变成粉红色、红色、深色或棕褐色），并且治疗部位的毛发可能会脱落。

大多数皮肤反应会在治疗开始的第一周左右出现，但每个人的时间可能会有所不同。有些人直到完成放射治疗后才出现皮肤反应。

皮肤反应通常会在最后一次治疗的几周后消失。某些皮肤变化（例如皮肤变黑或形成疤痕）可能是永久性的（永远不会消失）。

放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

这里有一些提示，可以保护皮肤并有助于改善皮肤的感觉：

生活习惯与健康

- 触碰治疗部位的皮肤要非常温和。
- 穿宽松舒适的衣服。
- 不要让治疗部位的皮肤受风和被阳光直射。如果无法遮盖相关区域，请使用 SPF 至少为 30 的防晒霜。
- 只要皮肤没有破损或发炎，就可以游泳。最好在游泳后立即淋浴。轻轻洗去氯气，轻轻拍干并涂上润肤露

清洁和保湿

- 要保持皮肤湿润，防止干燥。没有证据表明有哪种乳霜或产品在这方面效果更佳。如果您喜欢某个产品或品牌，请继续使用。
- 如果没有润肤露，请使用水基保湿霜（水是成分表中的第一项）。
- 开始放射治疗后，每天要多次使用润肤露。
- 您可以使用除味剂和止汗剂。
- 淋浴或使用浴缸沐浴时，请使用温水（不是热水）并用柔软的毛巾轻轻拍干。
- 如果要脱毛，请使用电动脱毛器。
- 如果您有皮肤反应，BC 省癌症中心的医护团队可能会要求您在治疗区域使用类固醇药膏或抗生素。

治疗区域的禁忌

- 在接受治疗的皮肤上不要使用香水、酒精、紧肤水和粘合剂。
- 避免过热或过冷（加热垫、冰袋、桑拿等）。
- 不要使用热水浴缸或按摩浴缸（Jacuzzi®）。

- 不要揉搓、抓挠或按摩接受治疗区域的皮肤。

支持服务

Support Services

BC 省癌症中心致力于为患有癌症或受其影响的患者提供帮助，在医护过程中，在身体、实践、情感和心理方面为其提供支持。

- 可在我们的网站上找到相关资源：www.bccancer.bc.ca/coping
- 可为各地患者和家庭提供咨询和支持的小组：
www.bccancer.bc.ca/supportprograms
- 在线支持：www.cancerchatcanada.ca

*如果您有任何问题和疑虑，请咨询 BC 省癌症中心为您提供服务的医护团队。

饮酒和吸烟

Alcohol and Smoking

在治疗期间请尽量不要吸烟。吸烟可能会引起更多不适，并增加您的副作用。

戒烟对所有年龄段的人都有重大而直接的好处。戒烟可以：

- 帮助提高身体的康复能力。
- 改善您的身体对癌症治疗的反应。
- 降低癌症复发或引发其他癌症的风险。
- 降低肺炎和呼吸衰竭（肺部无法正常工作）的风险。

如果您吸烟或最近戒了烟，请咨询 BC 省癌症中心的医护团队以获取更多信息。您也可以登录 BC 省癌症中心网站，浏览 [Smoking Cessation Program](#)（戒烟计划）页面。



放射治疗的副作用护理：骨盆区

Care of Radiation Therapy Side Effects: Pelvic Area

Provincial Health Services Authority

酒精可能会加重您的副作用，具体取决于您要治疗的身体部位。少量酒精对某些人来说可能没关系。请向 BC 省癌症中心为您提供服务的医护团队咨询。